

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（100mL） ルートキープ用 ※点滴ルートにインラインフィルターを使用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	ボラミン注5mg（1mL） ■アロキシ静注（0.75mg／5mL） デキサート注射液6.6mg2mL [デカトロン注後発] 生理食塩液（50mL） 15 分かけて	1 A 1 瓶 1 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	生理食塩液（100mL） 30 分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	サイラムザ点滴静注(5mLシムザ) 生理食塩液（250mL） 60 分かけて （初回時60分、2回目以降30分） ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製－	8 mg/kg 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	生理食塩液（50mL） 全開で	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	レボホリナート点滴静注用(アイホリン後発) ブドウ糖注射液（5%250mL） 2 時間で滴下 ＜CPT-11と同時に開始＞ －薬剤部調製－	200 mg/m ² 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
007 注射	イリノテカン塩酸塩注(カプト後発) ブドウ糖注射液（5%250mL） 側管から 90 分かけて －薬剤部調製－	150 mg/m ² 1 瓶	化学療法点滴 サイド1	●
008 注射	フルオロウラシル注(5Fu注後発) 生理食塩液（50mL） 全開で －薬剤部調製－	400 mg/m ² 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
009 注射	フルオロウラシル注(5Fu注後発) 輸液（自動計算） 3.0 mL／H 46 時間で滴下 リザーバ－使用(ニフロンジュア－フューサ－A) (生食を加え、総用量135mlに調製) －薬剤部調製－	2400 mg/m ² 自動	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法 (Day2-3)：デカトロン錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回				