血275 EPd療法（Elo/POM/DEX）　【1コース目用】　05-04-1660

レジメン期間：28日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用 【内服】ﾛｷｿﾌﾞﾛﾌｪﾝ錠(60mg) 1錠	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●
002 注射	ポララミン注５ｍｇ（1mL） (腎)ガスター注射液２０ｍｇ（２０mg２ml） デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］ 生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて	1 A 1 A 1 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●
003 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） 45　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●
004 注射	エムプリシティ点滴静注(ｴﾛﾂｽﾞﾏﾌﾞ) 注射用水（２０ｍｌプラボトル） 生理食塩液（２５０ｍＬ） （30mL/hで開始し、30mL/h→60mL/h→120mL/hと30分毎に速度を上げる。最大120mL/hまで。） ※点滴ﾙｰﾄに0.22ﾐｸﾛﾝ以下のｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 (400mg製品：注水17mL/1Vで溶解。300mg製品：注水13mL/1Vで溶解。) (体重50kg未満：生食150mL，体重90kg超：生食350mLに変更) ー薬剤部調製ー	10 mg/kg 2 A 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●			
005 注射	エムプリシティ点滴静注(ｴﾛﾂｽﾞﾏﾌﾞ) 注射用水（２０ｍｌプラボトル） 生理食塩液（２５０ｍＬ） （180mL/hで開始し、180mL/h→240mL/hと30分毎に速度を上げる。最大240mL/hまで。） ※点滴ﾙｰﾄに0.22ﾐｸﾛﾝ以下のｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 (400mg製品：注水17mL/1Vで溶解。300mg製品：注水13mL/1Vで溶解。) (体重50kg未満：生食150mL，体重90kg超：生食350mLに変更) ー薬剤部調製ー	10 mg/kg 2 A 1 袋	化学療法点滴 メイン1		●		
006 注射	エムプリシティ点滴静注(ｴﾛﾂｽﾞﾏﾌﾞ) 注射用水（２０ｍｌプラボトル） 生理食塩液（２５０ｍＬ） 300　ｍｌ／Ｈ ※点滴ﾙｰﾄに0.22ﾐｸﾛﾝ以下のｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 (400mg製品：注水17mL/1Vで溶解。300mg製品：注水13mL/1Vで溶解。) (体重50kg未満：生食150mL，体重90kg超：生食350mLに変更) ー薬剤部調製ー	10 mg/kg 2 A 1 袋	化学療法点滴 メイン1			●	●

【レジメンコメント】

【内服】75才以下：ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ錠(4mg) 28mg/Body Day1,8,15,22

　　76才以上：ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ錠(4mg)　8mg/Body Day1,8,15,22

ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ投与3時間前までに内服

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠(60mg) 1錠 Day1,8,15,22

ﾎﾟﾏﾘｽﾄｶﾌﾟｾﾙ(4mg)　4mg/Body Day1～21

※体重50kg未満：生食150mL，体重90kg超：生食350mLに変更して下さい。

1コース目専用ﾚｼﾞﾒﾝ。