血299 DMPB療法【Dar皮下注】　　【1コース目用】　05-04-2810

レジメン期間：42日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 4	Day 8	Day 11	Day 15	Day 22	Day 25	Day 29	Day 32	Day 36
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		●		●	●		●		●
002 注射	アセリオ静注液１０００mgバッグ（100mL） １５分かけて	1 袋	化学療法点滴 メイン1	●		●		●	●		●		●
003 注射	ポララミン注５ｍｇ（1mL） デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］ 生理食塩液（１００ｍｌ） ３０分かけて	1 A 3 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		●		●	●		●		●
004 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ３０分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		●		●	●		●		●
005 注射	ダラキューロ配合皮下注(ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ) ３～５分かけて皮下注射 ※臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に投与 ※同一部位への反復注射や同一部位に他の薬剤を投与しないこと －薬剤部調製－	1800 mg/body	皮下注射 －	●		●		●	●		●		●
006 注射	ベルケイド[皮下](ﾎﾞﾙﾃﾞｿﾞﾐﾌﾞ) 生理食塩液（５ｍｌ） （溶解用：1V/1.2ml） －薬剤部調製－	1.3 mg/㎡ 1.2 ml	皮下注射 －	●	●	●	●		●	●	●	●	

【レジメンコメント】

【内服】ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄOD錠(10mg)　1錠　Day1(ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ投与1～3時間前)

【内服】ｱﾙｹﾗﾝ錠(2mg)　9mg/m2 Day1～4

【内服】ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠(5mg)　60mg/m2 Day2～4

【ダラキューロ皮下注】※同一部位への反復注射は行わないこと。また、同一部位に他の薬剤を投与しないこと

※ダラキューロ投与開始１～３時間前に、解熱鎮痛剤、ステロイド及び抗ヒスタミン剤を投与すること

【注意】1コース目（初回治療）専用のレジメンです。