血344 IsaKd療法（Isa/Car/DEX）　【1コース目用】　05-04-3004

レジメン期間：28日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 2	Day 8	Day 9	Day 15	Day 16	Day 22	Day 23
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用 ※サークリサ投与終了後、生食でウォッシュアウトし、ルートキープ用を5%ブドウ糖へ変更すること。	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		●		●		●	
002 注射	アセリオ静注液１０００mgバッグ（100mL） 15　分かけて	1 袋	化学療法点滴 メイン1	●		●		●		●	
003 注射	ポララミン注５ｍｇ（1mL） (腎)ガスター注射液２０ｍｇ（２０mg２ml） デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］ 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて	1 Ａ 1 Ａ 3 Ｖ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		●		●		●	
004 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		●		●		●	
005 注射	サークリサ点滴静注（ｲｻﾂｷｼﾏﾌﾞ） 輸液（自動計算） ※投与速度は換算表(初回用)参照、単位注意 ※点滴ﾙｰﾄにO.22ﾐｸﾛﾝ以下のｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 ー薬剤部調製(全量250mlに調製)ー	10 mg/kg 自動	化学療法点滴 メイン1	●							
006 注射	サークリサ点滴静注（ｲｻﾂｷｼﾏﾌﾞ） 輸液（自動計算） ※infusion reactionを認めない場合、投与速度は換算表(2回目以降用)参照、単位注意 ※点滴ﾙｰﾄにO.22ﾐｸﾛﾝ以下のｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 ー薬剤部調製(全量250mlに調製)ー	10 mg/kg 自動	化学療法点滴 メイン1			●		●		●	
007 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		●		●		●	
008 注射	ブドウ糖注射液（　５％１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●	●	●		
009 注射	デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］ ブドウ糖注射液（　５％１００ｍｌ） 30　分かけて	3 Ｖ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1		●		●		●		●
010 注射	ブドウ糖注射液（　５％　２０ｍｌ） カイプロリス開始前に、ルートをフラッシュ	1 Ａ	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●	●	●		
011 注射	カイプロリス点滴静注(ｶﾙﾌｨﾙｿﾞﾐﾌﾞ) 注射用水（２０ｍｌプラボトル） ブドウ糖注射液（　５％１００ｍｌ） 30　分かけて （溶解用） ー薬剤部調製ー	20 mg/㎡ 1 Ａ 0.5 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●						
012 注射	カイプロリス点滴静注(ｶﾙﾌｨﾙｿﾞﾐﾌﾞ) 注射用水（２０ｍｌプラボトル） ブドウ糖注射液（　５％１００ｍｌ） 30　分かけて （溶解用） ー薬剤部調製ー	56 mg/㎡ 3 Ａ 0.5 瓶	化学療法点滴 メイン1			●	●	●	●		

【レジメンコメント】

【サークリサ】

※投与速度は、:換算表参照、単位に注意してください。

・Day1:換算表(初回用)

・Day8,15,22:infusion reactionを認めない場合、換算表(2回目以降用)

※配合変化のため、サークリサ投与終了後、生食でウォッシュアウトし、
ルートキープ用の生食を5%ブドウ糖へ変更すること。

【注意】1コース目（初回治療）専用のレジメンです。