

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（100ml） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	アセリオ静注液1000mgバッグ（100mL） 15分かけて	1 袋	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	ボラミン注5mg（1mL） デキサート注射液6.6mg2mL [デカド注後発] 生理食塩液（100ml） 30分かけて	1 A 3 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	生理食塩液（100ml） 30分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	ダラキューロ配合皮下注(ダラムブ/ホルピロニダゼ) 3～5分かけて皮下注射 ※臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に投与 ※同一部位への反復注射や同一部位に他の薬剤を投与しないこと 一薬剤部調製－	1800 mg/body	皮下注射 －	●
【レジメンコメント】 【内服】レフラミドカプセル(5mg) 25mg/body Day1～21 レデックス錠(4mg) 20mg/body Day2, 8～9, 15～16, 22～23 【ダラキューロ皮下注】※同一部位への反復注射は行わないこと。また、同一部位に他の薬剤を投与しないこと。 ※ダラキューロ投与開始1～3時間前に、解熱鎮痛剤、ステロイド及び抗ヒスタミン剤を投与すること ＊7コース目以降専用レジメンです。				