血267 DMPB療法 (Dar/L-PAM/PSL/Bor)　　【1コース目用】　05-04-2600

レジメン期間：42日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 4	Day 8	Day 11	Day 15	Day 22	Day 25	Day 29	Day 32	Day 36
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		●		●	●		●		●
002 注射	アセリオ静注液１０００mgバッグ（100mL） １５分かけて	1 袋	化学療法点滴 メイン1	●		●		●	●		●		●
003 注射	ポララミン注５ｍｇ（1mL） デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］ 生理食塩液（１００ｍｌ） ３０分かけて	1 A 3 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		●		●	●		●		●
004 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ３０分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		●		●	●		●		●
005 注射	ダラザレックス注(ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ) 生理食塩液「テルモ」（１Ｌ） (50mL/hから開始し、１時間毎に50mL/hずつ速度を上げる。最大200mL/hまで。) ※点滴ﾙｰﾄにO.2ﾐｸﾛﾝのｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 ー薬剤部調製ー	16 mg/kg 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●		●		●					
006 注射	ダラザレックス注(ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ) 生理食塩液「テルモパック」（５００ｍｌ） (100mL/hから開始し、１時間毎に50mL/hずつ速度を上げる。最大200mL/hまで。) ※点滴ﾙｰﾄにO.2ﾐｸﾛﾝのｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 ー薬剤部調製ー	16 mg/kg 1 袋	化学療法点滴 メイン1						●		●		●
007 注射	ベルケイド[皮下](ﾎﾞﾙﾃﾞｿﾞﾐﾌﾞ) 生理食塩液（５ｍｌ） （溶解用：1V/1.2ml） ー薬剤部調製ー	1.3 mg/㎡ 1.2 ml	皮下注射 ー	●	●	●	●		●	●	●	●	

【レジメンコメント】
【内服】ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄOD錠(10mg)　1錠　Day1(ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ投与1～3時間前)
【内服】ｱﾙｹﾗﾝ錠(2mg)　9mg/m2 Day1～4
【内服】ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠(5mg)　60mg/m2 Day2～4
＊ｲﾝﾌｭｰｼﾞｮﾝﾘｱｸｼｮﾝを認めなかった場合、
2投目より生理食塩液1000mL→500mLへ変更可
3投目より投与開始速度50mL/h→100mL/hへ変更可
(day22以降は生食500mL、投与開始速度100mL/hで登録しています)
＊ｲﾝﾌｭｰｼﾞｮﾝﾘｱｸｼｮﾝを認める場合、
day22以降の投与開始速度100mL/h→50mL/hへ変更して下さい
【注意】1コース目（初回治療）専用のレジメンです。