血293 DBd療法【Dar皮下注】　　【1～3コース目用】　05-04-2010

レジメン期間：21日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 4	Day 8	Day 11	Day 15
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		●		●
002 注射	アセリオ静注液１０００mgバッグ（100mL） １５分かけて	1 袋	化学療法点滴 メイン1	●		●		●
003 注射	ポララミン注５ｍｇ（1mL） デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］ 生理食塩液（１００ｍｌ） ３０分かけて	1 A 3 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		●		●
004 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ３０分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		●		●
005 注射	ダラキューロ配合皮下注(ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ) ３～５分かけて皮下注射 ※臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に投与 ※同一部位への反復注射や同一部位に他の薬剤を投与しないこと －薬剤部調製－	1800 mg/body	皮下注射 －	●		●		●
006 注射	ベルケイド[皮下](ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ) 生理食塩液（５ｍｌ） （溶解用：1V/1.2ml） －薬剤部調製－	1.3 mg/㎡ 1.2 ml	皮下注射 －	●	●	●	●	

【レジメンコメント】

【内服】ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ錠(4mg)　20mg/body Day2, 4～5, 9, 11～12

【ダラキューロ皮下注】※同一部位への反復注射は行わないこと。また、同一部位に他の薬剤を投与しないこと

※ダラキューロ投与開始１～３時間前に、解熱鎮痛剤、ステロイド及び抗ヒスタミン剤を投与すること

【注意】1～3コース目専用のレジメンです。