血217 DLd療法 (Dar/Len/DEX)　　【1コース目用】　05-04-2100

レジメン期間：28日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●
002 注射	アセリオ静注液１０００mgバッグ（100mL） １５分かけて	1 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●
003 注射	ポララミン注５ｍｇ（1mL） デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］ 生理食塩液（１００ｍｌ） ３０分かけて	1 A 3 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●
004 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ３０分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●
005 注射	ダラザレックス注(ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ) 生理食塩液「テルモ」（１ｌ） (50mL/hから開始し、１時間毎に50mL/hずつ速度を上げる。最大200mL/hまで。) ※点滴ﾙｰﾄに0.2ﾐｸﾛﾝのｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 ー薬剤部調製ー	16 mg/kg 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●

【レジメンコメント】

ｲﾝﾌｭｰｼﾞｮﾝﾘｱｸｼｮﾝを認めなかった場合、

2投目より生理食塩液1000mL→500mLへ変更可

3投目より投与開始速度50mL/h→100mL/hへ変更可

【内服】ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ(5mg)　25mg/body Day1～21

ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ錠(4mg)　20mg/body Day2, 9, 16, 23

＊1ｺｰｽ目（初回治療）専用のﾚｼﾞﾒﾝです。