血204 E-Ld療法 (Elo/Len/DEX)　【2コース目用】　05-04-1550

レジメン期間：28日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用 【内服】ﾛｷｿﾌﾞﾛﾌｪﾝ錠(60mg) 1錠	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●
002 注射	ポララミン注５ｍｇ（1mL） (腎)ガスター注射液２０ｍｇ（２０mg２ml） デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発] 生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて	1 A 1 A 1 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●
003 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） 45　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●
004 注射	エムプリシティ点滴静注(ｴﾛﾂﾞﾏﾌﾞ) 注射用水（２０ｍｌプラボトル） 生理食塩液（２５０ｍＬ） 300　ｍｌ／Ｈ ※点滴ﾙｰﾄに0.22ﾐｸﾛﾝ以下のｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 (400mg製品：注水17mL/1Vで溶解。300mg製品：注水13mL/1Vで溶解。) ー薬剤部調製ー	10 mg/kg 2 A 230 ml	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●

【レジメンコメント】

【内服】ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ錠(4mg) 28mg/BodyDay1,8,15,22

ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ投与3時間前までに内服

ﾛｷｿﾌﾞﾛﾌｪﾝ錠(60mg) 1錠 Day1,8,15,22

ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ(5mg)　25mg/Body Day1～21

※体重46kg未満の場合、希釈液：生食5mL/kgに減量して下さい。2コース目専用ﾚｼﾞﾒﾝ。