# 血300 DMPB療法【Dar皮下注】　　【2～9コース目用】　05-04-2820

**レジメン期間：42日**

| Rp | 薬品／コメント | 投与量 | 用法／手技・ルート | Day 1 | Day 8 | Day 22 | Day 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 注射 | 生理食塩液（１００ｍｌ）<br><br>ルートキープ用 | 1 瓶 | 化学療法点滴<br>メイン1 | ● | | ● | |
| 002 注射 | アセリオ静注液１０００mgバッグ（100mL）<br><br>１５分かけて | 1 袋 | 化学療法点滴<br>メイン1 | ● | | ● | |
| 003 注射 | ポララミン注５ｍｇ（1mL）<br>デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］<br>生理食塩液（１００ｍｌ）<br><br>３０分かけて | 1 A<br>3 V<br>1 瓶 | 化学療法点滴<br>メイン1 | ● | | ● | |
| 004 注射 | 生理食塩液（１００ｍｌ）<br><br>３０分かけて | 1 瓶 | 化学療法点滴<br>メイン1 | ● | | ● | |
| 005 注射 | ダラキューロ配合皮下注(ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ)<br><br>３～５分かけて皮下注射<br>※臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に投与<br>※同一部位への反復注射や同一部位に他の薬剤を投与しないこと<br>－薬剤部調製－ | 1800 mg/body | 皮下注射<br>－ | ● | | ● | |
| 006 注射 | ベルケイド[皮下](ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ)<br>生理食塩液（５ｍｌ）<br><br>（溶解用：1V/1.2ml）<br>－薬剤部調製－ | 1.3 mg/㎡<br>1.2 ml | 皮下注射<br>－ | ● | ● | ● | ● |

【レジメンコメント】

【内服】ｱﾙｹﾗﾝ錠(2mg)　9mg/m2 Day1～4

【内服】ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠(5mg)　60mg/m2 Day2～4

【ダラキューロ皮下注】※同一部位への反復注射は行わないこと。また、同一部位に他の薬剤を投与しないこと

※ダラキューロ投与開始１～３時間前に、解熱鎮痛剤、ステロイド及び抗ヒスタミン剤を投与すること

【注意】2～9コース目専用のレジメンです。