

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（100ml） ルートキープ用 【内服】ロキソ [®] ロフィン錠(60mg) 1錠	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	ボラミン注5mg（1mL） (腎)ガスター注射液20mg（20mg2ml） デキサー [®] ト注射液6.6mg2mL [テ [®] カ [®] ト [®] 注後発] 生理食塩液（50mL） 15 分かけて	1 A 1 A 1 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	生理食塩液（100ml） 45 分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	エムプリシティ点滴静注(エロツ [®] マ [®]) 注射用水（20ml プラボトル） 生理食塩液（250mL） 300 ml／H ※点滴ルートに0.22ミクロン以下のインラインフィルターの使用 (400mg製品：注水17mL/1Vで溶解。300mg製品：注水13mL/1Vで溶解。) (体重50kg未満：生食150mL、 体重90kg超：生食350mLに変更) ー薬剤部調製ー	20 mg/kg 4 A 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 【内服】 75才以下：レタ [®] ックス錠(4mg) 28mg/Body Day1 40mg/Body Day8, 15, 22 76才以上：レタ [®] ックス錠(4mg) 8mg/Body Day1 20mg/Body Day8, 15, 22 エム [®] リシティ投与3時間前までに内服 ロキソ [®] ロフィン錠(60mg) 1錠 Day1 ホ [®] マリストカ [®] セル(4mg) 4mg/Body Day1～21 ※体重50kg未満：生食150mL、 体重90kg超：生食350mLに変更して下さい。 4コース目以降専用レジ [®] メン。				