

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 15
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
002 注射	アセリオ静注液１０００mgバッグ（100mL） １５分かけて	１ 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●
003 注射	ボラミン注５mｇ（1mL） デキサート注射液6.6mg2mL [デ`カ`ロ`ン注後発] 生理食塩液（１００mｌ） ３０分かけて	１ A ３ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
004 注射	生理食塩液（１００mｌ） ３０分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
005 注射	ダラキューロ配合皮下注(ダ`ラ`ムマブ`/ホ`ル`ビ`アル`ロ`ニ`ダ`ー`セ`) ３～５分かけて皮下注射 ※臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に投与 ※同一部位への反復注射や同一部位に他の薬剤を投与しないこと －薬剤部調製－	1800 mg/body	皮下注射 －	●	●
【レジメンコメント】 【内服】ホ`マリス`ト`カ`フ`セル 4mg/body Day1～21 75歳未満：レ`テ`ツ`クス`錠(4mg) 20mg/body Day2, 8～9, 16, 22～23 75歳以上：レ`テ`ツ`クス`錠(4mg) 20mg/body Day8, 22 【ダラキューロ皮下注】※同一部位への反復注射は行わないこと。また、同一部位に他の薬剤を投与しないこと ※ダラキューロ投与開始１～３時間前に、解熱鎮痛剤、ステロイド及び抗ヒスタミン剤を投与すること *3～6コース目専用のレジ`メ`ン`です。					