血345 IsaKd療法（Isa/Car/DEX）　【2コース目以降用】　05-04-3007

レジメン期間：28日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 2	Day 8	Day 9	Day 15	Day 16	Day 22	Day 23
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用 ※サークリサ投与終了後、生食でウォッシュアウトし、ルートキープ用を5%ブドウ糖へ変更すること。	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●				●			
002 注射	アセリオ静注液１０００mgバッグ（100mL） 15　分かけて	1 袋	化学療法点滴 メイン1	●				●			
003 注射	ポララミン注５ｍｇ（1mL） (腎)ガスター注射液２０ｍｇ（２０mg２ml） デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］ 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて	1 A 1 A 3 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●				●			
004 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●				●			
005 注射	サークリサ点滴静注（ｲｻﾂｷｼﾏﾌﾞ） 輸液（自動計算） ※infusion reactionを認めない場合、投与速度は換算表(2回目以降用)参照、単位注意 ※点滴ﾙｰﾄにO.22ﾐｸﾛﾝ以下のｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 －薬剤部調製(全量250mlに調製)－	10 mg/kg 自動	化学療法点滴 メイン1	●				●			
006 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●				●			
007 注射	ブドウ糖注射液（　５％１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●	●	●		
008 注射	デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］ ブドウ糖注射液（　５％１００ｍｌ） 30　分かけて	3 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1		●	●	●		●	●	●
009 注射	ブドウ糖注射液（　５％　２０ｍｌ） カイプロリス開始前に、ルートをフラッシュ	1 A	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●	●	●		
010 注射	カイプロリス点滴静注(ｶﾙﾌｨﾙｿﾞﾐﾌﾞ) 注射用水（２０ｍｌプラボトル） ブドウ糖注射液（　５％１００ｍｌ） 30　分かけて （溶解用） －薬剤部調製－	56 mg/㎡ 3 A 0.5 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●	●	●		

【レジメンコメント】
【サークリサ】
※infusion reactionを認めない場合、投与速度は換算表(2回目以降用)参照、単位に注意してください。
※配合変化のため、サークリサ投与終了後、生食でウォッシュアウトし、
　ルートキープ用の生食を5%ブドウ糖へ変更すること。
【注意】2コース目以降専用のレジメンです。