

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 15
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用 【内服】ロキソ [®] ロフィン錠(60mg) １錠	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
002 注射	ボラミン注5mｇ（1mL） （腎）ガスター注射液２０mg（２０mg2ml） デキサー [®] ト注射液6.6mg2mL [テ [®] カト [®] ロ注後発] 生理食塩液（５０mL） 15 分かけて	１ A １ A １ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
003 注射	生理食塩液（１００mｌ） 45 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
004 注射	エムプリシ [®] ティ点滴静注(エロツ [®] マ [®]) 注射用水（２０mｌ プラボトル） 生理食塩液（２５０mL） 300 mｌ／H ※点滴ルートに0.22ミクロン以下のインラインフィルタ [®] を使用 (400mg製品：注水17mL/1Vで溶解。300mg製品：注水 13mL/1Vで溶解。) －薬剤部調製－	10 mg/kg ２ A 230 ml	化学療法点滴 メイン1	●	●
【レジメンコメント】 【内服】レテ [®] ックス錠(4mg) 28mg/BodyDay1, 15 エム [®] リン [®] ティ投与3時間前までに内服 レテ [®] ックス錠(4mg) 40mg/Body Day8, 22 レ [®] ラミト [®] カ [®] セル(5mg) 25mg/Body Day1～21 ロキソ [®] ロフィン錠(60mg) １錠 Day1, 15 ※体重46kg未満の場合、希釈液：生食5mL/kgに減量。					