

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 15
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
002 注射	アセリオ静注液１０００mgバッグ（100mL） 15 分かけて	１ 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●
003 注射	ボラミン注５mｇ（1mL） （腎）ガスター注射液２０mｇ（２０mg2ml） デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｭｰｶｰﾄﾞ注後発] 生理食塩液（１００mｌ）  30 分かけて (75歳以上はﾃﾞｭｰｶｰﾄﾞ 2.5Vに変更すること)	１ A １ A ５ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
004 注射	生理食塩液（５０mL） 15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
005 注射	サークリサ点滴静注（ｲｯｼｭﾏﾌﾞ） 輸液（自動計算）  ※infusion reactionを認めない場合、投与速度は換算表(2回目以降用)参照、単位注意 ※点滴ﾚｰﾄに0.22ﾐｸﾛﾝ以下のｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾄｰを使用 －薬剤部調製(全量250mlに調製)－	10 mg/kg 自動	化学療法点滴 メイン1	●	●
【レジメンコメント】 【内服】 ・ ﾎﾟﾏﾘｽﾄｶﾌﾟｾﾙ(4mg) 4mg/Body Day1～21 ・ ﾚﾃﾞｭｰｸｽ錠(4mg) :75歳未満 40mg/body Day8, 22 :75歳以上 20mg/body Day8, 22 ※75歳以上 : ﾃﾞｭｰｶｰﾄﾞ 2.5Vに変更してください。（Day1, 15） ※infusion reactionを認めない場合、投与速度は換算表(2回目以降用)参照、単位に注意してください。					