

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用 ９：４５	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	ポララミン注５m g（1mL） （腎）ガスター注射液２０m g（２０mg2ml） デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｭｶﾞｰﾄﾞﾝ注後発] 生理食塩液（５０mL）  15 分かけて ９：４５	１ A １ A ３ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	■アロキシ静注（０． ７５mg／５mL） 生理食塩液（１００mｌ）  30 分かけて １０：００	１ 瓶 １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	パクリタキセル注(ﾎﾟｸﾘｰﾙ後発) 生理食塩液「テルモパック」（５００mｌ）  3 時間で滴下 （※点滴ルートにインラインフィルターを使用） １０：３０ <L0:175mg/m <sup>2</sup> , L1:135mg/m <sup>2</sup> , L2:110mg/m <sup>2</sup> > －薬剤部調製－	175 mg/m <sup>2</sup> １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	カルボプラチン点滴(ﾊﾞｰﾗﾌﾞﾗﾁﾝ) ブドウ糖注射液（ ５％２５０mｌ）  60 分かけて (max:1,000mg/body) １３：３０ <L0:AUC=5, AUC=4, L2:AUC=3> －薬剤部調製－	5 AUC １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法 (Day2-3)：ﾃﾞｭｶﾞｰﾄﾞﾝ錠 (0.5mg) １回8錠、１日2回				