

| Rp | 薬品／コメント | 投与量 | 用法／手技・ルート | Day 1 | Day 8 | Day 15 |
|-----------|---|-----------------------------|----------------|----------|----------|-----------|
| 001 注射 | 生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用 | １ 瓶 | 化学療法点滴 メイン1 | ● | ● | ● |
| 002 注射 | トラスツズマブBS注 (ハセブチン) 注射用水（２０ｍｌ ブラボトル） 生理食塩液（２５０ｍＬ） 30 分かけて （初回時 90分、2回目以降30分） <初回時:8mg/kg, 2回目以降:6mg/kg> (150mg製品：注水7.2mL/1Vで溶解。60mg製品：注水 3mL/1Vで溶解。) －薬剤部調製－ | 6 mg/kg １ A １ 袋 | 化学療法点滴 メイン1 | ● | | |
| 003 注射 | ポララミン注5 m g（1mL） (腎) ガスター注射液 2 0 m g（2 0mg 2 ml） デキサート注射液6. 6mg2mL [ﾃﾞｻﾞｰﾄﾞﾝ注後発] 生理食塩液（５０ｍＬ） 15 分かけて | １ A １ A １ V １ 瓶 | 化学療法点滴 メイン1 | ● | ● | ● |
| 004 注射 | 生理食塩液（１００ｍｌ） 30 分かけて | １ 瓶 | 化学療法点滴 メイン1 | ● | ● | ● |
| 005 注射 | パクリタキセル注 (ｷｸｼｰﾙ後発) ブドウ糖注射液（５％２５０ｍｌ） 60 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製－ | 80 mg/m ² １ 瓶 | 化学療法点滴 メイン1 | ● | ● | ● |