

乳054 ペムブロリズマブ【併用】（乳がん） 49-28-0120
レジメン期間：21日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（100mL） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	キイトルーダ点滴静注（ペムブロリズマブ） 生理食塩液（100mL） 30 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製（最終濃度 1～10mg/mL）－	200 mg/body 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	生理食塩液（50mL） 15 分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 ※乳055 weekly nab-PTX療法【併用】レジメンと併用の場合、 点滴ルートのインラインフィルター有無に注意 キイトルーダ⇒点滴ルートにインラインフィルターを使用する アブラキサン⇒点滴ルートにインラインフィルターを使用しない				

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8	Day 15
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ）	１ 瓶	化学療法点滴 メイン１		●	●
	ルートキープ用					
002 注射	ボラミン注５ｍｇ（１ｍｌ） （腎）ガスター注射液２０ｍｇ（２０ｍｇ２ｍｌ） デキスト注射液６.６mg2mL [7/16/20注後発]	１ A １ A １ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン１	●	●	●
	生理食塩液（５０ｍｌ）					
003 注射	15 分かけて 生理食塩液（１００ｍｌ）	１ 瓶	化学療法点滴 メイン１	●	●	●
	30 分かけて バクリタキセル注（7/16/20注後発） ブドウ糖注射液（５％２５０ｍｌ）	90 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン１			
004 注射	60 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 薬剤部調製			●	●	●

【レジメンコメント】
※乳054 ベムプロリズマブ【併用】（乳がん）レジメンの点滴終了後に開始