

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（100mL） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	ペバシズマブBS注(7h <sup>+</sup> スチ <sup>+</sup> 後続) 生理食塩液（100mL）  30 分かけて （初回時90分、2回目60分、以降30分） －薬剤部調製－	5 mg/kg 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	冷 アロカリス点滴静注（235mg/10mL） パロノセトロン静注（0.75mg/5mL）[7h <sup>+</sup> 後発] デキサート注射液6.6mg2mL [7 <sup>+</sup> カ <sup>+</sup> ロン注後発] 生理食塩液（100mL）  30 分かけて	1 瓶 1 瓶 1 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	イリノテカン塩酸塩注(カ <sup>+</sup> ト <sup>+</sup> 後発) ブドウ糖注射液（ 5%250mL）  90 分かけて －薬剤部調製－	165 mg/m <sup>2</sup> 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	レボホリナート点滴静注用(7i <sup>+</sup> ホ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> 後発) ブドウ糖注射液（ 5%250mL）  2 時間で滴下 <L-OHPと同時に開始> －薬剤部調製－	200 mg/m <sup>2</sup> 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	オキサリプラチン点滴(ル <sup>+</sup> 7 <sup>+</sup> ラ <sup>+</sup> ト <sup>+</sup> 後発) ブドウ糖注射液（ 5%250mL）  側管から 2 時間で滴下 －薬剤部調製－	85 mg/m <sup>2</sup> 1 瓶	化学療法点滴 サイド1	●
007 注射	フルオロウラシル注(5Fu注後発) 輸液（自動計算）  2.8 mL／H 48 時間で滴下 リサ <sup>+</sup> -ハ <sup>+</sup> -使用(ニ <sup>+</sup> 7 <sup>+</sup> ロ <sup>+</sup> ジュ <sup>+</sup> 7 <sup>+</sup> -フュー <sup>+</sup> サ <sup>+</sup> -A) （生食を加え、総用量135mlに調製） －薬剤部調製－	3000 mg/m <sup>2</sup> 自動	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法（Day2-4）：7 <sup>+</sup> カ <sup>+</sup> ロ <sup>+</sup> ン錠（0.5mg）1回8錠、1日2回				