

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（100mL） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	ペバシズマブBS注（7h <sup>+</sup> スチン） 生理食塩液（100mL）  30 分かけて （初回時90分、2回目60分、以降30分） －薬剤部調製－	5 mg/kg 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	■アロキシ静注（0.75mg／5mL） デキサート注射液6.6mg2mL [デ <sup>+</sup> カ <sup>+</sup> ドン注後発] 生理食塩液（50mL）  全開で	1 瓶 1 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	レボホリナート点滴静注用（7h <sup>+</sup> 注後発） ブドウ糖注射液（5%250mL）  2 時間で滴下 ＜CPT-11と同時に開始＞ －薬剤部調製－	200 mg/m <sup>2</sup> 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	イリノテカン塩酸塩注（カ <sup>+</sup> 注後発） ブドウ糖注射液（5%250mL）  側管から 90 分かけて －薬剤部調製－	150 mg/m <sup>2</sup> 1 瓶	化学療法点滴 サイド1	●
006 注射	フルオロウラシル注（5Fu注後発） 生理食塩液（50mL）  全開で －薬剤部調製－	400 mg/m <sup>2</sup> 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
007 注射	フルオロウラシル注（5Fu注後発） 輸液（自動計算）  3.0 mL／H 46 時間で滴下 リ <sup>+</sup> ザ <sup>+</sup> ー <sup>+</sup> 使用（ニ <sup>+</sup> ロ <sup>+</sup> ジュ <sup>+</sup> 7- <sup>+</sup> ジュ <sup>+</sup> ー <sup>+</sup> A） （生食を加え、総用量135mlに調製） －薬剤部調製－	2400 mg/m <sup>2</sup> 自動	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法（Day2-3）：デ <sup>+</sup> カ <sup>+</sup> ドン錠（0.5mg）1回8錠、1日2回				