

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用 【内服】Day1-14 カ ^レ シ ^レ ビ ^レ ン錠、2,400～4,200mg/分 2/day(朝夕食後)	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	ペバシズマブBS注(7h ^レ スチン) 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて （初回時90分、2回目60分、以降30分） －薬剤部調製－	7.5 mg/kg １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	■アロキシ静注（0. 7 5 mg／5 mL） デキサート注射液6.6mg2mL [デ ^レ カ ^レ ト ^レ ン注後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶 １ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	オキサリプラチン点滴(エル ^レ ラット) ブドウ糖注射液（ ５％５００mｌ） 2 時間で滴下 －薬剤部調製－	130 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法 (Day2-3)：デ ^レ カ ^レ ト ^レ ン錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回				