

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
002 注射	イミフィンジ点滴(デュルパルマブ) 生理食塩液（２５０mL） 60 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 ※体重が30kg以下の場合、20mg/kg －薬剤部調製(最終濃度:1～15mg/mL)－	1500 mg/body １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●	
003 注射	生理食塩液（５０mL） 15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
004 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL) [アロキシ後発] デキサート注射液6.6mg2mL [テカトロン注後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶 １ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
005 注射	シスプラチン点滴静注(ランタ後発) 生理食塩液「テルモパック」（５００mｌ） 60 分かけて 【要】遮光 －薬剤部調製－	25 mg/m ² １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●
006 注射	生理食塩液「テルモパック」（５００mｌ） 60 分かけて	１ 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●
007 注射	ゲムシタビン点滴(ジエムザール後発) 生理食塩液（２５０mL） 30 分かけて －薬剤部調製－	1000 mg/m ² １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●
【レジメンコメント】 制吐療法 (Day2-3, 9-10)：テカトロン錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回 ※体重が30kg以下の場合、イミフィンジは 20mg/kg ※最大8コースまで					