

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	ブドウ糖注射液（ 5％100m l） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	■アロキシ静注（0. 75mg／5mL） デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｭｶﾞｰﾄﾞﾝ注後発] ブドウ糖注射液（ 5％100m l）  30 分かけて	1 瓶 1 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	ブドウ糖注射液（ 5％ 20m l）  ルートをフラッシュ	1 A	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	エンハーツ注(ﾄﾗｽｸｽﾞﾏﾌﾞ ﾃﾞﾙｸｽﾃｶﾝ) 注射用水（20m l プラボトル） ブドウ糖注射液（ 5％100m l）  90 分かけて （初回時90分、2回目以降30分） 【要】遮光 ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 ※調製後、4時間以内に投与を終了 －薬剤部調製（注水5mL/1Vで溶解）－	6.4 mg/kg 1 A 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法 (Day2-3)：ﾃﾞｭｶﾞｰﾄﾞﾝ錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回				