

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	冷　アロカリス点滴静注（235mg/10mL） パロノセトロン静注(0.75mg/5mL) [アロキシ後発] デキサート注射液6.6mg2mL [デカトロン注後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30　分かけて	１ 瓶 １ 瓶 1.5 ｖ １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	オキサリプラチン点滴(エルプラット後発) ブドウ糖注射液（　５％２５０mｌ） 2　時間で滴下 －薬剤部調製－	85 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	レボホリナート点滴静注用(アイトリン後発) ブドウ糖注射液（　５％２５０mｌ） 2　時間で滴下 <CPT-11と同時に開始> －薬剤部調製－	200 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	イリノテカン塩酸塩注(カプト後発) ブドウ糖注射液（　５％２５０mｌ） 側管から 90　分かけて －薬剤部調製－	150 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 サイド1	●
006 注射	フルオロウラシル注(5Fu注後発) 輸液（自動計算） 3.0　mｌ／H 46　時間で滴下 リザーバー使用(ニフロシュア-フューサー-A) (生食を加え、総用量135mlに調製) －薬剤部調製－	2400 mg/m ² 自動	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法 (Day2-4)：デカトロン錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回				