

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（100mL） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	冷アロカリス点滴静注（235mg/10mL） パロノセトロン静注（0.75mg/5mL）[7回後発] デキサート注射液6.6mg2mL [7回後発] 生理食塩液（100mL） 30 分かけて	1 瓶 1 瓶 1.5 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	オキサリプラチン点滴（1mg/mL後発） ブドウ糖注射液（5%250mL） 2 時間で滴下 ー薬剤部調製ー	85 mg/m ² 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	レボホリナート点滴静注用（750mg後発） ブドウ糖注射液（5%250mL） 2 時間で滴下 <CPT-11と同時に開始> ー薬剤部調製ー	200 mg/m ² 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	イリノテカン塩酸塩注（100mg後発） ブドウ糖注射液（5%250mL） 側管から 90 分かけて ー薬剤部調製ー	180 mg/m ² 1 瓶	化学療法点滴 サイド1	●
006 注射	フルオロウラシル注（5Fu注後発） 生理食塩液（50mL） 全開で ー薬剤部調製ー	400 mg/m ² 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
007 注射	フルオロウラシル注（5Fu注後発） 輸液（自動計算） 3.0 mL／H 46 時間で滴下 リザーバー使用（ニブロー7-チューサー-A） （生食を加え、総用量135mlに調製） ー薬剤部調製ー	2400 mg/m ² 自動	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法（Day2-4）：デキサメタゾン（0.5mg） 1回8錠、1日2回				