消090 GEM/nab-PTX療法　49-21-0050
レジメン期間：28日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8	Day 15
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
002 注射	■アロキシ静注（０．７５mg／５mL） デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］ 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて	1 瓶 1 Ｖ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
003 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 全開で	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
004 注射	アブラキサン点滴静注(ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ) 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用しない －薬剤部調製(1V/20mlで調製。残りの生食は廃棄)－	125 mg/㎡ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
005 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 全開で	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
006 注射	ゲムシタビン点滴(ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ後) 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて －薬剤部調製－	1000 mg/㎡ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●

【レジメンコメント】

制吐療法(Day2-3,9-10,16-17)：ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回