

消120 オニバイド+I-LV 5-FU療法 49-21-0060
レジメン期間：14日

| Rp | 薬品／コメント | 投与量 | 用法／手技・ルート | Day 1 |
|--|--|------------------------------|----------------|----------|
| 001 注射 | 生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用 | １ 瓶 | 化学療法点滴 メイン1 | ● |
| 002 注射 | ■アロキシ静注（0. 7 5 mg／5 mL） デキサート注射液6. 6mg2mL [ﾃﾞｻﾞｰﾄﾞﾎﾝ注後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて | １ 瓶 1. 5 V １ 瓶 | 化学療法点滴 メイン1 | ● |
| 003 注射 | オニバイド点滴注（ｲﾝﾌｴｸｼｮﾝ ﾘﾎﾞｼｰﾙ） ブドウ糖注射液（ ５％５００mｌ） 90 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用しない －薬剤部調製－ | 70 mg/m ² １ 瓶 | 化学療法点滴 メイン1 | ● |
| 004 注射 | 生理食塩液（５０mL） 全開で | １ 瓶 | 化学療法点滴 メイン1 | ● |
| 005 注射 | レボホリナート点滴静注用（ｱｲﾝﾌｴｸｼｮﾝ後発） ブドウ糖注射液（ ５％２５０mｌ） 2 時間で滴下 －薬剤部調製－ | 200 mg/m ² １ 瓶 | 化学療法点滴 メイン1 | ● |
| 006 注射 | フルオロウラシル注（5Fu注後発） 輸液（自動計算） 3. 0 mｌ／H 46 時間で滴下 ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ使用（ﾆﾌﾟﾛｼｬｱ-ﾌｴｰｻﾞ-A） （生食を加え、総用量135mlに調製） －薬剤部調製－ | 2400 mg/m ² 自動 | 化学療法点滴 メイン1 | ● |
| 【レジメンコメント】 制吐療法（Day2-3）：ﾃﾞｻﾞｰﾄﾞﾎﾝ錠（0. 5mg） 1回8錠、1日2回 ※UGT1A1＊6もしくは＊28のホモ接合体、UGT1A1＊6及び＊28のヘテロ接合体の場合 → オニバイド 50mg/m2へ減量して開始する。 | | | | |