

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用 【内服】アプレピタントCap(125mg) 1Cap	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL) [アプレシ後発] デキサート注射液6.6mg2mL [デキサート注後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶 1.5 V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	エビルピシン注(ファルピシ後発) 生理食塩液（１００mｌ） 全開で 一薬剤部調製一	90 mg/m <sup>2</sup> １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	エンドキサン注(シクロホスファミド) 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて 一薬剤部調製一	600 mg/m <sup>2</sup> １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法 (Day1)：アプレピタントCap(125mg) 1回1Cap、1日1回(エビルピシン注開始60分前) 制吐療法 (Day2-3)：アプレピタントCap(80mg) 1回1Cap、1日1回				