

乳073 ダトロウェイ単剤療法 49-26-0150
レジメン期間：21日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	ブドウ糖注射液（ 5% 100m l） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL) [7時後発] デキサート注射液6.6mg2mL [7時後発] *(腎)ガスター注射液20mg（20mg 2ml） ボララミン注5mg（1mL） 生理食塩液（50mL） 15 分かけて	1 瓶 1 V 1 A 1 A 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	ブドウ糖注射液（ 5% 20m l） ルートをフラッシュ	1 A	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	ダトロウェイ点滴静注(ダトホマブ デルタカン) 注射用水（20m l プラボトル） ブドウ糖注射液（ 5% 100m l） 90 分かけて (初回時90分、2 回目以降30分) 【要】遮光 ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 ※調製後、4時間以内に投与を終了 一薬剤部調製（注水5mL/1Vで溶解）－	6 mg/kg 1 A 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 【内服】ロソフ ロフィン錠(60mg) 1錠 Day1（ダトロウェイ 開始30分前に服用） 制吐療法(Day2-3)：デカトロン錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回				