

乳058 DXR/CPA+ヘムムブリスマブ療法 49-28-0160-01
レジメン期間：21日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用 【内服】アブレブタントCap(125mg) 1Cap	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	キイトルーダ点滴静注（ヘムムブリスマブ） 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製（最終濃度：1～10mg/mL）－	200 mg/body １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	生理食塩液（５０mL） 全開で	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL) [アキシ後発] デキサート注射液6.6mg2mL [デカトロン注後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶 1.5 V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	ドキソルビシン塩酸塩注(アトリアシ後発) 生理食塩液（１００mｌ） 全開で －薬剤部調製－	60 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	エンドキサン注(シロキスファスト) 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて －薬剤部調製－	600 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法 (Day1)：アブレブタントCap(125mg) 1回1Cap、1日1回(トキシルン注開始60分前) 制吐療法 (Day2-3)：アブレブタントCap(80mg) 1回1Cap、1日1回				