

乳053 CBDCA/GEM+ヘムブロスタマブ併用療法 49-28-0110
レジメン期間：21日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
002 注射	キイトルーダ点滴静注（ヘムブロスタマブ） 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製（最終濃度：1～10mg/mL）－	200 mg/body １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
003 注射	生理食塩液（５０mL） 15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
004 注射	ケラセトロン点滴静注パック3mg100mL[カイトリル後発] デキサート注射液6.6mg2mL [デカトロン注後発] 30 分かけて	１ 袋 １ V	化学療法点滴 メイン1	●	●
005 注射	カルボプラチン点滴（パラプラチン） ブドウ糖注射液（５％２５０mｌ） 60 分かけて －薬剤部調製－	2 AUC １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
006 注射	ゲムシタピン点滴（シエムザール後） 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて －薬剤部調製－	1000 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
【レジメンコメント】 制吐療法（Day2-3, 9-10）：デカトロン錠（0.5mg）1回8錠、1日2回					