

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用 【内服】ロキソ <sup>®</sup> ロフィン錠(60mg) １錠	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
002 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL) [7日 <sup>※</sup> 後発] デキサート注射液6.6mg2mL [テ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ン注後発] *(腎)ガスター注射液２０mg（２０mg 2ml） ポララミン注５mg（1mL） 生理食塩液（５０mL）  15 分かけて	１ 瓶 １ V １ A １ A １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
003 注射	生理食塩液（５０mL）  全開で	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
004 注射	トロデルビ点滴静注(サリッス <sup>®</sup> マフ <sup>®</sup> ゴ <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> テ <sup>®</sup> ン) 生理食塩液（２５０mL）  3 時間で滴下 (初回時3時間、２回目2時間、以降60分) 【要】遮光 一薬剤部調製(最終濃度:1.1～3.4mg/mL)ー	10 mg/kg １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●
【レジメンコメント】 【内服】ロキソ <sup>®</sup> ロフィン錠(60mg) １錠 Day1, 8(トロデルビ開始30分前に服用) 制吐療法(Day2-3)：テ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ン錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回					