乳057 weekly-PTX/CBDCA+ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ療法　49-28-0150
レジメン期間：21日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8	Day 15
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
002 注射	キイトルーダ点滴静注(ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ) 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 ー薬剤部調製(最終濃度:1～10mg/mL)ー	200 mg/body 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		
003 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 全開で	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		
004 注射	ポララミン注５ｍｇ（1mL） (腎)ガスター注射液２０ｍｇ（２０mg２ml） デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発] 生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて	1 Ａ 1 Ａ 1 Ｖ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
005 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)[ｱﾛｷｼ後発] 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて	1 瓶 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		
006 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1		●	●
007 注射	パクリタキセル注(ﾀｷｿｰﾙ後発) ブドウ糖注射液（　５%２５０ｍｌ） 60　分かけて （※点滴ﾙｰﾄにｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用） ー薬剤部調製ー	80 mg/㎡ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
008 注射	カルボプラチン点滴(ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ後発) ブドウ糖注射液（　５%２５０ｍｌ） 60　分かけて (max:750mg/body) ー薬剤部調製ー	5 AUC 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		

【レジメンコメント】
制吐療法(Day2-3)：ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回