

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8
001 注射	フェスゴ配合皮下注MA (ヘ`ルツス`マフ`/トラスツス`マフ`/ホ`ルヒ7アルロニタ 5分以上かけて、大腿部に皮下注射 ※同一箇所へ繰り返し注射することは避け、前回の注射部位から少なくとも2.5cm離すこと ※大腿部以外の部位への投与は避けること ※皮膚が敏感な部位、皮膚に異常のある部位(傷、発疹、発赤、硬結等)には注射しないこと －薬剤部調製－	1 瓶/body	皮下注射 －	●	
002 注射	生理食塩液（100mL） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
003 注射	デキサート注射液6.6mg2mL [デ`ガ`ロン注後発] 生理食塩液（100mL） 30 分かけて	1 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
004 注射	ハラヴェン静注(エリブリン) 生理食塩液（50mL） 全開で －薬剤部調製－	1.4 mg/m ² 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
【レジメンコメント】 【フェスゴ配合皮下注】 ※同一箇所へ繰り返し注射することは避け、前回の注射部位から少なくとも2.5cm離すこと ※大腿部以外の部位への投与は避けること ※皮膚が敏感な部位、皮膚に異常のある部位(傷、発疹、発赤、硬結等)には注射しないこと 【予定された投与が遅れた場合には、以下のとおり投与することが望ましい】 ・前回投与日から6週間未満の時 → 維持投与量 ・前回投与日から6週間以上の時 → 初回投与量					