

レジメン期間：21日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day ↓
001 注射	生理食塩液（100mL） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	キイトルーダ点滴静注（ペムブロリズマブ） 生理食塩液（100mL） 30 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製（最終濃度：1～10mg/mL）－	200 mg/body 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	生理食塩液（50mL） 15 分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 ※乳055 weekly nab-PTX療法【併用】 レジメンと併用の場合、 点滴ルートのインラインフィルター有無に注意 キイトルーダ⇒点滴ルートにインラインフィルターを使用する アブラキサン⇒点滴ルートにインラインフィルターを使用しない				

乳055 weekly nab-PTX療法【併用用】 49-28-0130

レジメン期間：28日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8	Day 15
001 注射	生理食塩液（100ml） ルートキープ用 ※インラインフィルターの使用（キットルダ⇒必要。777キリン⇒不可。）	1 瓶	化学療法点滴 メイン1		●	●
002 注射	デキサート注射液 6.6mg/2mL [777キリン注後発] 生理食塩液（100ml） 30 分かけて	1 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
003 注射	生理食塩液（50mL） 全開で	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
004 注射	アブラキサン点滴静注（パナソニック） 生理食塩液（50mL） 30 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用しない ー薬剤師調整（IV/20mlで調製。残りの生食は廃棄）ー	100 mg/m ² 40 ml	化学療法点滴 メイン1	●	●	●

【レジメンコメント】

※乳054 ベムプロリズマブ【併用】（乳がん）レジメンの点滴終了後に開始

※点滴ルートのインラインフィルター有無に注意

キットルダ⇒点滴ルートにインラインフィルターを使用する

アブラキサン⇒点滴ルートにインラインフィルターを使用しない