乳064 フェスゴ+w-PTX療法【初回投与量】 (IN) 49-27-0360

レジメン期間：21日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8	Day 15
001 注射	フェスゴ配合皮下注IN(ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ/ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀ ８分以上かけて、大腿部に皮下注射 ※同一箇所へ繰り返し注射することは避け、前回の注射部位から少なくとも2.5cm離すこと ※大腿部以外の部位への投与は避けること ※皮膚が敏感な部位、皮膚に異常のある部位(傷、発疹、発赤、硬結等)には注射しないこと －薬剤部調製－	1 瓶/body	皮下注射 －	●		
002 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
003 注射	ポララミン注５ｍｇ（1mL） (腎)ガスター注射液２０ｍｇ（２０mg２ml） デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発] 生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて	1 Ａ 1 Ａ 1 Ｖ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
004 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
005 注射	パクリタキセル注(ﾀｷｿｰﾙ後発) ブドウ糖注射液（　５%２５０ｍｌ） 60　分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製－	80 mg/㎡ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●

【レジメンコメント】

【フェスゴ配合皮下注】

※同一箇所へ繰り返し注射することは避け、前回の注射部位から少なくとも2.5cm離すこと

※大腿部以外の部位への投与は避けること

※皮膚が敏感な部位、皮膚に異常のある部位(傷、発疹、発赤、硬結等)には注射しないこと

【予定された投与が遅れた場合には、以下のとおり投与することが望ましい】

・前回投与日から６週間未満の時　→ 維持投与量

・前回投与日から６週間以上の時　→ 初回投与量