呼105 CBDCA/PEM＋ﾄﾚﾒﾘﾑﾏﾌﾞ＋ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ療法(体重＞30kg)【4コース目用】＋維持療法【初回】　49-07-0250

レジメン期間：77日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 22	Day 50
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
002 注射	イジュド点滴静注(ﾄﾚﾒﾘﾑﾏﾌﾞ) 生理食塩液（２５０ｍＬ） 60　分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 ー薬剤部調製(最終濃度:0.1～10mg/mL)ー	75 mg/body 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●		●
003 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		●
004 注射	イミフィンジ点滴(ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ) 生理食塩液（２５０ｍＬ） 60　分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 ※体重が30kg以下の場合、20mg/kg ー薬剤部調製(最終濃度:1～15mg/mL)ー	1500 mg/body 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
005 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
006 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)[ｱﾛｷｼ後発] デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発] 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて	1 瓶 1 Ｖ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		
007 注射	デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発] 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて	1 Ｖ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1		●	●
008 注射	ペメトレキセド注 (ｱﾘﾑﾀ後発) 生理食塩液（１００ｍｌ） 10　分かけて 【内服】ﾊﾟﾝﾋﾞﾀﾝ末(1g) 1日1回,1回1包,連日 ー薬剤部調製ー	500 mg/㎡ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
009 注射	カルボプラチン点滴(ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ後発) ブドウ糖注射液（　５%２５０ｍｌ） 60　分かけて ー薬剤部調製ー	6 AUC 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		

【レジメンコメント】

※体重が30kg以下の場合、イミフィンジは 20mg/kg

制吐療法(Day2-3)：ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回

【注射】ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ注(500μg) 1回2A,筋肉注射,9週毎