

| Rp | 薬品／コメント | 投与量 | 用法／手技・ルート | Day 1 |
|--|---|------------------------------|----------------|----------|
| 001 注射 | 生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用 | １ 瓶 | 化学療法点滴 メイン1 | ● |
| 002 注射 | デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｻﾞｰﾄﾞﾝ注後発] ＊(腎)ガスター注射液２０mｇ(２０mg2ml) ポララミン注５mｇ（1mL) 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて | 1.5 V 1 A 1 A 1 瓶 | 化学療法点滴 メイン1 | ● |
| 003 注射 | アセリオ静注液１００0mgバッグ（100mL) 15 分かけて | １ 袋 | 化学療法点滴 メイン1 | ● |
| 004 注射 | 生理食塩液（５０mL） 15 分かけて | １ 瓶 | 化学療法点滴 メイン1 | ● |
| 005 注射 | ライブリバント点滴静注(ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ) 輸液（自動計算） 125mL/H ※点滴ﾙｰﾄに0.2ﾐｸﾛﾝのｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 －薬剤部調製(全量250mLに調製)－ | 1750 mg/body 自動 | 化学療法点滴 メイン1 | ● |
| 006 注射 | 生理食塩液（５０mL） 15 分かけて | １ 瓶 | 化学療法点滴 メイン1 | ● |
| 007 注射 | ペメトレキセド注（ｱﾘﾏﾀ後発） 生理食塩液（１００mｌ） 10 分かけて 【内服】ﾊﾞﾝﾋﾞﾀﾝ末(1g) 1日1回,1回1包,連日 －薬剤部調製－ | 500 mg/m ² 1 瓶 | 化学療法点滴 メイン1 | ● |
| 【レジメンコメント】 【注射】ﾓﾎﾞﾗﾐﾝ注(500μg) 1回2A,筋肉注射,9週毎 | | | | |