呼136 ﾗｾﾞﾙﾁﾆﾌﾞ＋ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ療法【体重80kg以上:2ｺｰｽ目以降用】　49-09-0120
レジメン期間：28日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 15
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
002 注射	デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］ ＊(腎)ガスター注射液２０ｍｇ(２０mg２ml) ポララミン注５ｍｇ（1mL） 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて	1.5 Ｖ 1 Ａ 1 Ａ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
003 注射	アセリオ静注液１０００mgバッグ（100mL） 15　分かけて	1 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●
004 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
005 注射	ライブリバント点滴静注(ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ) 輸液（自動計算） 125mL/H ※点滴ﾙｰﾄにO.2ﾐｸﾛﾝのｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 －薬剤部調製(全量250mLに調製)－	1400 mg/body 自動	化学療法点滴 メイン1	●	●

【レジメンコメント】
【内服】 ラズクルーズ錠 240mg/body 1日1回 Day1～連日
【内服】 エリキュース錠 (2.5mg)　1日2回　1回1錠 Day1～
※ライブリバントとの併用投与による静脈血栓塞栓症の発症を抑制するため、
ラズクルーズ併用投与開始後4ヶ月間は、エリキュースを投与すること。