

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	イジユド点滴静注(トレリムマブ) 生理食塩液（２５０mL） 60 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製(最終濃度:0.1～10mg/mL)－	75 mg/body １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	生理食塩液（５０mL） 15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	イミフィンジ点滴(デウルバールマブ) 生理食塩液（２５０mL） 60 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 ※体重が30kg以下の場合、20mg/kg －薬剤部調製(最終濃度:1～15mg/mL)－	1500 mg/body １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	生理食塩液（５０mL） 15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL) [7時後発] デキサート注射液6.6mg2mL [7時45分後発] 生理食塩液（５０mL） 15 分かけて	１ 瓶 1.5 V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
007 注射	ペメトレキセド注 (7リムダ後発) 生理食塩液（１００mｌ） 10 分かけて 【内服】パルビチン末(1g) 1日1回,1回1包,連日 －薬剤部調製－	500 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
008 注射	塩化〔N a〕「補正液」1mEq/mL(20mL) リサク 硫酸M g 補正液1mEq/mL（２０mL） ソルデム３A 輸液（５００mｌ） 60 分かけて 【内服】77レビチントCap(125mg) 1Cap（シスプラチン注開始60分前）	20 ml 8 ml １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●
009 注射	マンニトール注（２０％３００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
010 注射	シスプラチン点滴静注(ランダ後発) 生理食塩液「テルモ」（１ｌ） 2 時間で滴下 【要】遮光 －薬剤部調製－	75 mg/m ² １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●
011 注射	塩化〔N a〕「補正液」1mEq/mL(20mL) ソルデム３A 輸液（５００mｌ） 60 分かけて	20 ml １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 ※体重が30kg以下の場合、イミフィンジは 20mg/kg 制吐療法 (Day1)：77レビチントCap(125mg) 1回1Cap、1日1回(シスプラチン注開始60分前) 制吐療法 (Day2-3)：77レビチントCap(80mg) 1回1Cap、1日1回 制吐療法 (Day2-4)：デキサート錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回（朝昼） 【注射】メコナミン注(500μg) 1回2A,筋肉注射,9週毎				