呼077 CBDCA/nab-PTX＋ペムブロリズマブ療法　49-07-0170

レジメン期間：21日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8	Day 15
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ﾙｰﾄｷｰﾌﾟ用　※ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰの使用（ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ⇒必要。ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ⇒不要。）	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
002 注射	キイトルーダ点滴静注(ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ) 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製(最終濃度:1～10mg/mL)－	200 mg/body 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		
003 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 全開で	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		
004 注射	■アロキシ静注（０．７５mg／５mL） デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］ 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて	1 瓶 1 Ｖ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		
005 注射	デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］ 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて	1 Ｖ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1		●	●
006 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 全開で	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
007 注射	アブラキサン点滴静注(ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ) 生理食塩液（５０ｍＬ） 30　分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用しない －薬剤部調製(1V/20mlで調製。残りの生食は廃棄)－	100 mg/㎡ 40 ml	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
008 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 全開で	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		
009 注射	カルボプラチン点滴(ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ) ブドウ糖注射液（　５%２５０ｍｌ） 60　分かけて －薬剤部調製－	6 AUC 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		

【レジメンコメント】

制吐療法(Day2-3)：ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回

※点滴ルートのインラインフィルター有無に注意

キイトルーダ⇒ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用、アブラキサン⇒ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用不可