

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（100mL） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	イミフィンジ点滴（デュルバルマブ） 生理食塩液（250mL） 60 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 ※体重が30kg以下の場合、20mg/kg －薬剤部調製（最終濃度：1～15mg/mL）－	1500 mg/body 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	生理食塩液（50mL） 15 分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	デキサート注射液6.6mg2mL [デガードン注後発] 生理食塩液（100mL） 30 分かけて	1 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	ペメトレキセド注（アリムダ後発） 生理食塩液（100mL） 10 分かけて 【内服】パルビチン末（1g）1日1回、1回1包、連日 －薬剤部調製－	500 mg/m ² 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 ※体重が30kg以下の場合、イミフィンジは 20mg/kg 【注射】メコナミン注（500μg）1回2A、筋肉注射、9週毎				