

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	ペバシズマブBS注（7h ⁺ スチン） 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて （初回時90分、2回目60分、以降30分） －薬剤部調製－	15 mg/kg １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	■アロキシ静注（0. 7 5mg／5mL） デキサート注射液6. 6mg2mL [テ ⁺ カ ⁺ ロン注後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶 １ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	アリムタ注（h ⁺ オレキ ⁺ ト） 生理食塩液（１００mｌ） 10 分かけて 【内服】h ⁺ ンビ ⁺ タ末（1g）１日1回, 1回1包, 連日 －薬剤部調製－	500 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	カルボプラチン点滴（h ⁺ ラ ⁺ ラチン） ブドウ糖注射液（ ５％２５０mｌ） 60 分かけて －薬剤部調製－	6 AUC １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法（Day2-3）：テ ⁺ カ ⁺ ロン錠（0. 5mg）１回8錠、１日2回 【注射】メコ ⁺ ラミン注（500μg）１回2A, 筋肉注射, 9週毎				