

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	テセントリク点滴(アテゾリズマブ) 生理食塩液（２５０mL） 60 分かけて （初回時60分、2回目以降30分） ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製－	1200 mg/body １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	生理食塩液（５０mL） 15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	■アロキシ静注（0. ７５mg／５mL） デキサート注射液6. 6mg2mL [アロキシ注後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶 １ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	アリムタ注(アモリタクト) 生理食塩液（１００mｌ） 10 分かけて 【内服】パニトミド末(1g) 1日1回, 1回1包, 連日 －薬剤部調製－	500 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	カルボプラチン点滴(パラーチン) ブドウ糖注射液（５％２５０mｌ） 60 分かけて －薬剤部調製－	6 AUC １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法 (Day2-3)：アロキシ錠(0. 5mg) 1回8錠、1日2回 【注射】メコナミン注(500μg) 1回2A, 筋肉注射, 9週毎				