呼135 ﾗｾﾞﾙﾁﾆﾌﾞ＋ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ療法【体重80kg以上:1ｺｰｽ目用】　49-09-0110

レジメン期間：28日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 2	Day 8	Day 15	Day 22
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●	●
002 注射	デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］ ＊(腎)ガスター注射液２０ｍｇ(２０mg２ml) ポララミン注５ｍｇ（1mL） 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて	1.5 Ｖ 1 Ａ 1 Ａ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●	●
003 注射	アセリオ静注液１０００mgバッグ（100mL） 15　分かけて	1 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●	●
004 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●	●
005 注射	ライブリバント点滴静注(ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ) 輸液（自動計算） (50mL/Hで2時間、その後、75mL/Hで終了まで) ※点滴ﾙｰﾄにO.2ﾐｸﾛﾝのｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 ー薬剤部調製(全量250mLに調製)ー	350 mg/body 自動	化学療法点滴 メイン1	●				
006 注射	ライブリバント点滴静注(ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ) 輸液（自動計算） (35mL/Hで2時間、その後、50mL/Hで終了まで) ※点滴ﾙｰﾄにO.2ﾐｸﾛﾝのｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 ー薬剤部調製(全量250mLに調製)ー	1050 mg/body 自動	化学療法点滴 メイン1		●			
007 注射	ライブリバント点滴静注(ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ) 輸液（自動計算） 65mL/H ※点滴ﾙｰﾄにO.2ﾐｸﾛﾝのｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 ー薬剤部調製(全量250mLに調製)ー	1400 mg/body 自動	化学療法点滴 メイン1			●		
008 注射	ライブリバント点滴静注(ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ) 輸液（自動計算） 85mL/H ※点滴ﾙｰﾄにO.2ﾐｸﾛﾝのｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 ー薬剤部調製(全量250mLに調製)ー	1400 mg/body 自動	化学療法点滴 メイン1				●	
009 注射	ライブリバント点滴静注(ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ) 輸液（自動計算） 125mL/H ※点滴ﾙｰﾄにO.2ﾐｸﾛﾝのｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 ー薬剤部調製(全量250mLに調製)ー	1400 mg/body 自動	化学療法点滴 メイン1					●

【レジメンコメント】

IR予防(Day-2、-1)：ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠【4mg】 1回2錠、1日2回

IR予防(Day1)：ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠【4mg】 1回2錠、1日1回(ﾗｲﾌﾞﾘﾊﾞﾝﾄ注開始60分前)

【内服】 ラズクルーズ錠 240mg/body 1日1回 Day1～連日

【内服】 エリキュース錠 (2.5mg) 1日2回　1回1錠 Day1～

※ライブリバントとの併用投与による静脈血栓塞栓症の発症を抑制するため、

ラズクルーズ併用投与開始後4ヶ月間は、エリキュースを投与すること。

※IR予防にデカドロン予防内服を考慮する

【注意】1コース目（初回治療）専用のレジメンです。