

呼094 CBDCA/PEM＋ニボルマブ＋化リムマブ療法 49-07-0220
レジメン期間：42日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 22
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
002 注射	オブジーボ点滴静注（ニボルマブ） 生理食塩液（５０mL） 30 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製（最終濃度0.35mg/mL以上）－	360 mg/body １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
003 注射	生理食塩液（５０mL） 30 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
004 注射	ヤーボイ点滴静注（化リムマブ） 生理食塩液（５０mL） 30 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製（最終濃度1～4mg/mL）－	1 mg/kg 30 ml	化学療法点滴 メイン1	●	
005 注射	生理食塩液（５０mL） 15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
006 注射	■アロキシ静注（0. 75mg／5mL） デキサート注射液6.6mg2mL [テカトロン注後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶 １ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
007 注射	アリムタ注（ペトリット） 生理食塩液（１００mｌ） 10 分かけて 【内服】パシタ末(1g) 1日1回, 1回1包, 連日 －薬剤部調製－	500 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
008 注射	カルボプラチン点滴（パラプラチン） ブドウ糖注射液（５％２５０mｌ） 60 分かけて －薬剤部調製－	5 AUC １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
【レジメンコメント】 制吐療法 (Day2-3)：テカトロン錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回 【注射】メパラミン注(500μg) 1回2A, 筋肉注射, 9週毎 ※このレジメンは、最大適用回数は1回です。					