

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（100mL） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	デキサート注射液6.6mg2mL [テカドロン注後発] * (腎) ガスター注射液 20mg（20mg2mL） ポララミン注5mg（1mL） 生理食塩液（100mL）  30 分かけて	1.5 V 1 A 1 A 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	アセリオ静注液1000mgバッグ（100mL）  15 分かけて	1 袋	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	生理食塩液（50mL）  15 分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	ライブリバント点滴静注(アミバンタマブ) 輸液（自動計算）  125mL/H ※点滴ルートに0.2ミクロンのインラインフィルターを使用 －薬剤部調製(全量250mLに調製)－	2100 mg/body 自動	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	生理食塩液（50mL）  15 分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
007 注射	ペメトレキセド注（アリム後発） 生理食塩液（100mL）  10 分かけて 【内服】バンビタマブ末(1g) 1日1回, 1回1包, 連日 －薬剤部調製－	500 mg/m <sup>2</sup> 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】				
【注射】メコパラミン注(500μg) 1回2A, 筋肉注射, 9週毎				