

呼103 CDDP/PEM+トレメチマブ+デュルバルマブ療法 体重>30kg【4コース目用】+維持療法【初回】(short hydration 49-06-0210
レジメン期間: 77日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 22	Day 50
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン１	●	●	●
002 注射	イジュード点滴静注（トリムムマ） 生理食塩液（２５０ｍｌ） 60 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製（最終濃度：0.1～10mg/mL）－	75 mg/body １ 袋	化学療法点滴 メイン１	●		●
003 注射	生理食塩液（５０ｍｌ） 15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン１	●		●
004 注射	イミフィンジ点滴（デ・エルムマ） 生理食塩液（２５０ｍｌ） 60 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 ※体重が30kg以下の場合、20mg/kg －薬剤部調製（最終濃度：1～15mg/mL）－	1500 mg/body １ 袋	化学療法点滴 メイン１	●	●	●
005 注射	生理食塩液（５０ｍｌ） 15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン１	●	●	●
006 注射	パロノセトロン静注（0.75mg/5mL）〔アロキ後発〕 デキサート注射液6.6mg2mL〔デ・カ・ロ注後発〕 生理食塩液（５０ｍｌ） 15 分かけて	１ 瓶 1.5 V １ 瓶	化学療法点滴 メイン１	●		
007 注射	デキサート注射液6.6mg2mL〔デ・カ・ロ注後発〕 生理食塩液（１００ｍｌ） 30 分かけて	１ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン１		●	●
008 注射	ペメトレキセド注（アリム後発） 生理食塩液（１００ｍｌ） 10 分かけて 【内服】パルビチン末（1g）１日１回、１回１包、連日 －薬剤部調製－	500 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン１	●	●	●
009 注射	塩化〔Na〕「補正液」1mEq/mL（20mL） リク 硫酸Mg 補正液1mEq/mL（２０mL） ソルデム３A 輸液（５００ｍｌ） 60 分かけて 【内服】アパ・レ・タントCap（125mg）1Cap（シス・ラチン注開始60分前）	20 ml 8 ml １ 袋	化学療法点滴 メイン１	●		
010 注射	マンニトール注（２０％３００ｍｌ） 30 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン１	●		
011 注射	シスプラチン点滴静注（リタ後発） 生理食塩液「テルモ」（１ｌ） 2 時間で滴下 【要】遮光 －薬剤部調製－	75 mg/m ² １ 袋	化学療法点滴 メイン１	●		
012 注射	塩化〔Na〕「補正液」1mEq/mL（20mL） ソルデム３A 輸液（５００ｍｌ） 60 分かけて	20 ml １ 袋	化学療法点滴 メイン１	●		

【レジメンコメント】
※体重が30kg以下の場合、イミフィンジは 20mg/kg
制吐療法（Day1）：アパ・レ・タントCap（125mg）１回1Cap、１日１回（シス・ラチン注開始60分前）
制吐療法（Day2-3）：アパ・レ・タントCap（80mg）１回1Cap、１日１回
制吐療法（Day2-4）：デ・カ・ロ錠（0.5mg）１回8錠、１日２回（朝昼）
【注射】メコ・ラチン注（500μg）１回2A、筋肉注射、9週毎