

呼093 CDDP/PEM+ニボルマブ+化リムブ療法(short hydration) 49-06-0190  
レジメン期間：42日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 22
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
002 注射	オブジーボ点滴静注（ニボルマブ） 生理食塩液（５０mL）  30 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製（最終濃度0.35mg/mL以上）－	360 mg/body １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
003 注射	生理食塩液（５０mL）  30 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
004 注射	ヤーボイ点滴静注（化リムブ） 生理食塩液（５０mL）  30 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製（最終濃度1～4mg/mL）－	1 mg/kg 30 ml	化学療法点滴 メイン1	●	
005 注射	生理食塩液（５０mL）  15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
006 注射	■アロキシ静注（0.75mg／5mL） デキサート注射液6.6mg2mL [デカトロン注後発] 生理食塩液（５０mL）  15 分かけて	１ 瓶 1.5 V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
007 注射	アリムタ注（ベトレチド） 生理食塩液（１００mｌ）  10 分かけて 【内服】パシトキシ末(1g) 1日1回, 1回1包, 連日 －薬剤部調製－	500 mg/m <sup>2</sup> １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
008 注射	塩化〔N a〕「補正液」1mEq/mL(20mL) リサ 硫酸M g 補正液1mEq／mL（２０mL） ソルデム３A 輸液（５００mｌ）  60 分かけて 【内服】アプレキントCap(125mg) 1Cap（シスプラチン注開始60分前）	20 ml 8 ml １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●
009 注射	マンニトール注（２０％３００mｌ）  30 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
010 注射	シスプラチン点滴静注（ランダ） 生理食塩液「テルモ」（１ｌ）  2 時間で滴下 【要】遮光 －薬剤部調製－	75 mg/m <sup>2</sup> １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●
011 注射	塩化〔N a〕「補正液」1mEq/mL(20mL) ソルデム３A 輸液（５００mｌ）  60 分かけて	20 ml １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●
【レジメンコメント】 制吐療法 (Day1)：アプレキントCap(125mg) 1回1Cap、1日1回(シスプラチン注開始60分前) 制吐療法 (Day2-3)：アプレキントCap(80mg) 1回1Cap、1日1回 制吐療法 (Day2-4)：デカトロン錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回（朝昼） 【注射】メコナミン注(500μg) 1回2A, 筋肉注射, 9週毎 ※このレジメンは、最大適用回数は1回です。					