

呼095 CBDCA/PTX+ニボルマブ+化リムマブ療法 49-07-0230  
レジメン期間：42日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 22
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
002 注射	オブジーボ点滴静注(ニボルマブ) 生理食塩液（５０mL）  30 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製(最終濃度0.35mg/mL以上)－	360 mg/body 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
003 注射	生理食塩液（５０mL）  30 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
004 注射	ヤーボイ点滴静注(化リムマブ) 生理食塩液（５０mL）  30 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製(最終濃度1～4mg/mL)－	1 mg/kg 30 ml	化学療法点滴 メイン1	●	
005 注射	生理食塩液（５０mL）  15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
006 注射	ボララミン注5mg（1mL） (腎)ガスター注射液20mg（20mg2ml） デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｭｶﾞｰﾄﾞﾝ注後発] 生理食塩液（５０mL）  15 分かけて	1 A 1 A 3 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
007 注射	■アロキシ静注（0.75mg／5mL） 生理食塩液（１００mｌ）  30 分かけて	1 瓶 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
008 注射	パクリタキセル注(ｷｬｰｰﾙ後発) 生理食塩液「テルモパック」（５００mｌ）  3 時間で滴下 (※点滴ルートにインラインフィルターを使用) －薬剤部調製－	200 mg/m <sup>2</sup> 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●
009 注射	カルボプラチン点滴(ﾊﾞｰﾌﾟﾗﾁﾝ) ブドウ糖注射液（５％250mｌ）  60 分かけて －薬剤部調製－	6 AUC 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
【レジメンコメント】 制吐療法(Day2-3)：ﾃﾞｭｶﾞｰﾄﾞﾝ錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回 ※このレジメンは、最大適用回数は1回です。					